






(3) 昭和42年4月1日

き た う ら



貴の小島知隆さんら三戸。二月中旬に突然発病、またたく間に全部のニワトリに伝染してしまったということです。このために、死んだり、薬殺処分をうけたものは、全部で5千2百55羽にものぼり、いずれも全滅というありさまであります。その後、いったん下火になつたもようですが、まだ警戒が必要だと思われます。このため、小貫部落一帯は、いまニワトリの移動禁止地区に指定されています。

村で被害を受けたのは、小貫の小島知隆さんら三戸。二月中旬に突然発病、またたく間に全部のニワトリに伝染してしまったということです。このために、死んだり、薬殺処分をうけたものは、全部で5千2百55羽にものぼり、いずれも全滅というありさまであります。その後、いったん下火になつたもようですが、まだ警戒が必要だと思われます。このため、小貫部落一帯は、いまニワトリの移動禁止地区に指定されています。

この病気の症状は、突然食綠色便が特徴

去年から全国的に流行していた恐ろしいニワトリの伝染病ニューカッスル病は、ことしになって、県内各地にも発生、大きな被害を出しておりました。ところがさる二月には、ついにこのきょう威が本村にまでおび、5千羽以上のニワトリが死んだり殺処分を受けるなど、大きな被害を出してしまいました。いったん発生すると周囲のニワトリが全滅するというこの病気は、今後も発生が予想されますので、十分注意してください。

## にわとり 5 千羽が被害 ニュー・カッスル病猛攻

### 必ず予防注射を

欲がなくなり、緑色の下痢便となるのが特徴で、口を開いたり、首を伸しながら「ゼイ、ガアガア」と声を出し苦しそうに呼吸をします。

そのうちに、とさかが紫色になり、眠ったようにぼんやりうずくまる。体をふるわせたり、口から血をはくものもあります。成鶏では急に産卵率が下ったり、まったく卵をうまくなったりします。

鶏舎の消毒も

この病気の病原体はウイルスですが、いまのところ人間や他の家畜には無害だといわれています。しかし、一部に

①、予防注射をする。注射後2週間ぐらいで免疫ができる、成鶏では6ヶ月、ひなでは2~3ヶ月効力が持続します。予防液は薬局へ注文すればとりよせてれます。

②、鶏舎はつねに消毒しようと。予防注射済みといつても安心は禁物。消毒も忘れずに。消毒液は、3

スチーマクリーナー(蒸気消毒機)2台を購入、用ください。(申し込みは産業課へ)

村ではこの対策として、蒸気消毒は効果が高い。

貸し出しますので、ご利用ください。

は、人間の目に炎症を起こすなど、人体にも有害だとする説もあります。この病原体は、卵・ふん・羽毛・肉などあらゆるもののがばいかいとなり伝染しますから、つぎのことを守ってください。

④、この病気の発生地附近からのヒナの導入はできるだけさけましょう。

なお、症状がこの病気に

なると思つたら、すぐ役場

または、家畜保健衛生所に届け出してください。こんどの発

生では、畜主の小島さんらがいち早く連絡、防疫に協力さ

れていたので、被害を最小限にく

いとめることができます。

また、予防注射や消毒は、

それぞれにすんで実施して

いたくになりますので、くわしくは、役場産業課・鉢

田家畜保健衛生所・農業改良普及所・農協におたずねくだ

さい。

（3）みだりに、人や家畜を

鶏舎内に入れない。鶏舎

の入口には踏み込み式の

消毒そうを備え、家族の

ものでも消毒がすまなければ鶏舎内に入れないよ

うにすることがたいせつです。

（4）この病気の発生地附近

からのヒナの導入はできるだけさけましょう。

なお、症状がこの病気に

なると思つたら、すぐ役場

または、家畜保健衛生所に届け出してください。こんどの発

生では、畜主の小島さんらがいち早く連絡、防疫に協力さ

れていたので、被害を最小限にく

いとめることができます。

また、予防注射や消毒は、

それぞれにすんで実施して

いたくになりますので、くわしくは、役場産業課・鉢

田家畜保健衛生所・農業改良普及所・農協におたずねくだ

さい。

（3）みだりに、人や家畜を

鶏舎内に入れない。鶏舎

の入口には踏み込み式の

消毒そうを備え、家族の

ものでも消毒がすまなければ鶏舎内に入れないよ

うにすることがたいせつです。

（4）この病気の発生地附近

からのヒナの導入はできるだけさけましょう。

なお、症状がこの病気に

なると思つたら、すぐ役場

または、家畜保健衛生所に届け出してください。こんどの発

生では、畜主の小島さんらがいち早く連絡、防疫に協力さ

れていたので、被害を最小限にく

いとめることができます。

また、予防注射や消毒は、

それぞれにすんで実施して

いたくになりますので、くわしくは、役場産業課・鉢

田家畜保健衛生所・農業改良普及所・農協におたずねくだ

さい。

（3）みだりに、人や家畜を

鶏舎内に入れない。鶏舎

の入口には踏み込み式の

消毒そうを備え、家族の

ものでも消毒がすまなければ鶏舎内に入れないよ

うにすることがたいせつです。

（4）この病気の発生地附近

からのヒナの導入はできるだけさけましょう。

なお、症状がこの病気に

なると思つたら、すぐ役場

または、家畜保健衛生所に届け出してください。こんどの発

生では、畜主の小島さんらがいち早く連絡、防疫に協力さ

れていたので、被害を最小限にく

いとめることができます。

また、予防注射や消毒は、

それぞれにすんで実施して

いたくになりますので、くわしくは、役場産業課・鉢

田家畜保健衛生所・農業改良普及所・農協におたずねくだ

さい。

（3）みだりに、人や家畜を

鶏舎内に入れない。鶏舎

の入口には踏み込み式の

消毒そうを備え、家族の

ものでも消毒がすまなければ鶏舎内に入れないよ

うにすることがたいせつです。

（4）この病気の発生地附近

からのヒナの導入はできるだけさけましょう。

なお、症状がこの病気に

なると思つたら、すぐ役場

または、家畜保健衛生所に届け出してください。こんどの発

生では、畜主の小島さんらがいち早く連絡、防疫に協力さ

れていたので、被害を最小限にく

いとめることができます。

また、予防注射や消毒は、

それぞれにすんで実施して

いたくになりますので、くわしくは、役場産業課・鉢

田家畜保健衛生所・農業改良普及所・農協におたずねくだ

さい。

（3）みだりに、人や家畜を

鶏舎内に入れない。鶏舎

の入口には踏み込み式の

消毒そうを備え、家族の

ものでも消毒がすまなければ鶏舎内に入れないよ

うにすることがたいせつです。

（4）この病気の発生地附近

からのヒナの導入はできるだけさけましょう。

なお、症状がこの病気に

なると思つたら、すぐ役場

または、家畜保健衛生所に届け出してください。こんどの発

生では、畜主の小島さんらがいち早く連絡、防疫に協力さ

れていたので、被害を最小限にく

いとめることができます。

また、予防注射や消毒は、

それぞれにすんで実施して

いたくになりますので、くわしくは、役場産業課・鉢

田家畜保健衛生所・農業改良普及所・農協におたずねくだ

さい。

（3）みだりに、人や家畜を

鶏舎内に入れない。鶏舎

の入口には踏み込み式の

消毒そうを備え、家族の

ものでも消毒がすまなければ鶏舎内に入れないよ

うにこれがよい。また、このウ

イルスは熱に弱いので、ご利用ください。

（3）みだりに、人や家畜を

鶏舎内に入れない。鶏舎

の入口には踏み込み式の

消毒そうを備え、家族の

&lt;p

