



ボリオ(小児マヒ)は一昨年全国に流行し、ことに北海道では大きな被害がありました。幸いに本町では三五年に一名発生しただけで、大事に至らずに終りました。これは予防接種が大きな役割を果しましたと考へて差支えありません。

ボリオはソークワクチンの注射と生ワクチン投与の二本立てで完全に予防されております。

予防接種はこの外にたくさんの種類があります。予防接種は法律で定期的に市町村が行うよう義務づけているものと任意のものと二通りあります。

定期の予防接種は次の期間内に行なうようになっています

生後二月	二月
小学校入学前六日以内	
// 卒業前	
ジフテリヤ	
生後三月～六月	
前号の予防接種後一二月	
から一八月	
小学入学前六月以内	
小学卒業前六月以内	
腸チフス・パラチフス	
生後三六月～四八月	
前号の予防接種後満六才	
百日咳	
生後二月～六月	
前号の予防接種後一二月	

## 手の洗い方

よく手洗をして一般に清潔にすることは伝染病や寄生虫を予防しますが、洗い方を誤ると子供が鼻をかんで、ほほに鼻汁をつけ平気でいるのと同じ結果になります。洗面器での手洗は大します。虫卵や、ばいきんを手全

（逆性石けんの価格は五〇〇円）

書かれてますと

1、手洗の励行

2、ハエ、ネズミの駆除

3、便所台所の改善

4、井戸の改善

5、生水生ものに注意

6、暴飲暴食を避ける

7、下痢したら赤痢と疑え

8、逆性石けんの価格は五〇〇円

書かれてますと

日本脑炎の予防接種は、

毎年と任意のものと二通りあります。

定期の予防接種は次の期間内に行なうようになっています

患者や保菌者の糞便とともに排出された赤痢菌は凸版のような経路をたどつて口から入ります。一口にいいますと、糞便を口へ入れるために感染するのですから入れないようにすればよいわけです。それにはまず手をきれいにすることです。私どもは手を自由に使い手のふれないところはありませんが、その反面極めて不潔です。用便後のチリ紙は数枚かさねても、また桜紙のようないい紙は数十枚かさねても

赤痢菌は手指につきます。手指がどの位糞便に汚染されているのかを調査した実例

によりますと、三〇%～七〇%位手指に大腸菌がみとめられます。

しかし赤痢だけはワクチンがなく予防注射ができないのでこの予防は各人の自覚によ

る外ありません。

赤痢菌は糞便とともに排出している場合が多く、抗性剤で素

人療法をして治つたつもりであります。

赤痢は便所と台所をつなぐ運送屋ですから、これらを駆除することも大切で

あります。

赤痢は左ななめの図のよう

な経路をたどり感染します。

赤痢は左ななめの図のよ

うな経路をたどり感染します。

赤痢は左ななめの図のよ

うな経路をたどり感染します。